

吐物処理手順

- 

吐物から半径2m
汚染区域
清潔区域
汚染区域と清潔区域を意識
- 


応援を求め、部屋を換気
近くの人を移動させる
- 

準備した物品を確認
してから作業開始
- 

消毒液をかけた紙
汚染区域
清潔区域
靴底を拭くため、嘔吐者は消毒紙を踏んで移動させる
- 

手袋2重
マスク・ガウン・シューズカバー・手袋2重を着用、ゴミ袋を2重
- 

汚染区域内
ウイルスが飛散しないように
吐物を覆い消毒液をかける
- 

汚染区域内
吐物をビニール袋に入れる
- 

汚染区域内
ヘラでかき集めヘラごと捨てる
- 

汚染区域内
新しい紙で再度吐物周辺を覆い、消毒液をかける
10分間待つ
- 

汚染区域の境界に紙を敷き詰め消毒液をかける
- 


清潔区域
汚染区域
シューズカバーを外して清潔区域に出る
- 

清潔区域
汚染区域
外側から中心に向かって往復せず一方向に寄せ消毒
- 

消毒で使用した紙類を内側の袋に入れる
- 

残った消毒液を袋内にかけて、ペットボトルと外側の手袋をゴミ袋へ
- 

内側のゴミ袋をしぼる
空気を抜かない
- 

手袋⇒ガウン⇒マスクの順で外す
- 

脱いだものを入れて、外側のゴミ袋を縛る
空気を抜かない
- 

最後に20秒以上かけてしっかり手洗い・うがいをする

※消毒液：0.1%程度に希釈した次亜塩素酸ナトリウム

家庭用漂白剤を使った 消毒液の作り方



水500mlに

漂白剤(濃度5%タイプ)を

5ml(ペットボトルの
キャップ ^{1杯} or ^{2杯})



※ 作るときは換気をして、ゴム手袋をはめてください。
製品に記載された「使用上の注意」を読んでから作業を。

どんなところに使えるの？

○ **1杯**: ドアノブ、テーブルなど、手がよく触れる場所



○ **2杯**: 吐物や便などがついた床、衣類など



使用方法は？

ペーパータオルに液を染み込ませ拭いた後、**水拭きをする**

※ 使用時も、換気をしてゴム手袋をはめてください



○ 拭き取り



× 噴霧