

【定点把握対象感染症発生状況(定点医療機関あたり患者数)】

あかし保健所 保健予防課
感染症対策係 電話:078-918-5421

小児科定点(7医療機関)

疾病名称\週	2019年				
	30	31	32	33	34
RSウイルス感染症	1.86	2.57	1.71	0.14	2.71
咽頭結膜熱	0.43	0.29	0.57	0.43	1.00
A群溶血性レンサ球菌咽頭炎	0.43	0.14	0.29	0.00	0.00
感染性胃腸炎	3.00	4.71	5.14	0.86	3.29
水痘	0.14	0.14	0.57	0.00	0.29
手足口病	16.00	14.86	11.71	2.43	3.86
伝染性紅斑	1.29	1.71	1.29	0.14	0.71
突発性発しん	0.00	0.00	0.86	0.29	0.29
ヘルパンギーナ	0.71	0.57	0.00	0.00	0.00
流行性耳下腺炎	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

インフルエンザ定点(11医療機関)

疾病名称\週	2019年				
	30	31	32	33	34
インフルエンザ	0.00	0.09	0.00	0.00	0.00

眼科定点(2医療機関)

疾病名称\週	2019年				
	30	31	32	33	34
急性出血性結膜炎	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
流行性角結膜炎	0.50	0.50	0.50	0.00	2.00

※定点医療機関あたり患者数とは


定点医療機関とは、保健所に一定の基準に従い、感染症の発生状況を報告してもらう医療機関のことです。

また、定点医療機関あたり患者数とは、一週間に一つの定点医療機関から、どのくらいの報告があったかを表す数値で、この数値によって各地での感染症の流行を把握することができます。


たとえば、あかし保健所管内で感染性胃腸炎の報告が合計20件あったとすると、定点医療機関あたりの患者数は、報告数(20件)をあかし保健所管内の定点医療機関数(7医療機関)で割り算をします。そうすると、定点医療機関あたりの患者数が計算できます。

この場合は、 $20 \div 7 = 2.86$ となります。

定点あたりのRSウイルス患者報告数



定点あたりの咽頭結膜熱患者報告数



【全数把握対象感染症発生状況】

あかし保健所 保健予防課 感染症対策係
電話:078-918-5421

感染症分類	疾病名称\週	2017年	2018年	2019年					
				30	31	32	33	34	1週～累計
二類	結核	69	79	1		2	2		32
三類	腸管出血性大腸菌感染症	2	11					1	8
	細菌性赤痢		1						0
四類	E型肝炎		1						0
	デング熱		1						0
	日本紅斑熱		1						0
	レジオネラ症	3	12						3
五類	アメーバ赤痢	2	3						0
	ウイルス性肝炎 (A型肝炎、E型肝炎を除く)	1	1						0
	侵襲性インフルエンザ菌感染症		2						3
	侵襲性肺炎球菌感染症	4	23						11
	水痘(入院例に限る)								1
	梅毒	8	11			1			8
	カルバペネム耐性腸内細菌感染症	5	2				1		2
	劇症型溶血性レンサ球菌感染症	2	3						1
	後天性免疫不全症候群	1	2						1
	播種性クリプトコックス症	1	0						1
	百日咳※	-	3	1					11
	麻しん	2	1						1
風しん		3					1	1	

※百日咳は2018年1月1日から五類感染症の全数届出対象となりました。

全国で風しん患者の発生が続いています

2019年第33週(8月12日～8月18日)に国内で25人が風しんと診断され報告されています。
第1～33週の風しん累積患者報告数は2,108人となり、第32週の2,079人から29人増加しました。
明石市内でも第34週に1人報告がありました。今後も感染拡大する恐れがあり、注意が必要です。

主な症状について

- ・高熱、淡く赤い全身性の発疹、耳の後ろ等のリンパ節の腫れが主な症状です。
- ・症状が出ない場合(不顕性感染)や、重篤な合併症併発まで幅広く、特に成人が発症した場合、高熱や発しんが長く続いたり、関節痛を認めるなど、小児より重症化することがあります。
- ・妊娠20週頃までの妊婦が風しんウイルスに感染すると、出生児が先天性風しん症候群を発症する可能性があります。

予防方法について

- ・風しんの予防接種(主に接種されているのは、麻しん風しん混合ワクチン)が最も有効な予防法です。
- ・既に妊娠している場合は、予防接種を受けることが出来ませんので、風しん流行時には外出を避け、人込みに近づかないようにするなどの注意が必要です。
- ・また、同居者に風しんにかかる可能性の高い方(例えば風しんワクチンの2回接種を完了していない方で、医療従事者や教育関係者など風しんウイルスに曝される可能性が高い者など)がおられる場合は、予防接種についてご検討ください。