1　今後の接種スケジュール（小児・乳幼児）

小 児

- 初回接種(1・2回目)
  - 令和６年３月３１日まで継続（令和４年２月開始）※9月下旬ワクチン変更予定(XBB.1.5へ)
- 追加接種(3回目以降)
  - オミクロン株ＸＢＢ．１．５対応１価ワクチンを使用した追加接種（９月下旬開始予定）　→『令和５年秋開始接種』

※　９月１９日までは、オミクロン株対応２価ワクチンを使用した追加接種

乳幼児

- 初回接種(1～3回目)
  - 令和６年３月３１日まで継続（令和４年10月開始）※ 9月下旬ワクチン変更予定(XBB.1.5へ)
- 追加接種(4回目以降)
  - オミクロン株ＸＢＢ．１．５対応１価ワクチンを使用した追加接種（９月下旬開始予定）　→『令和５年秋開始接種』

（※1）特例臨時接種の実施期間は令和 6 年 3 月 31 日までです。



２　小児接種

(1)　接種対象と使用ワクチン

初回接種（１・２回目）

（接種対象）　未接種、かつ１回目の接種日翌日に５歳以上１１歳以下

※年齢到達は、誕生日前日でカウントします（例：4月5日が5歳の誕生日の場合、4月4日から小児用ワクチンの接種が可能です。）
※初回接種については、１回目の接種時の年齢に基づいて判断します。１回目の接種時に11歳だったお子様が、
２回目の接種時までに12歳の誕生日を迎えた場合、２回目接種にも１回目と同じ小児用ワクチンを使用します。

（接種期間）　令和６年３月３１日まで

（接種回数・接種間隔）　２回　・　通常３週間の間隔

※１回目の接種から間隔が３週間を超えた場合、１回目から受け直す必要はありません。
できるだけ速やかに２回目の接種を受けていただくことをお勧めします。

（使用ワクチン）

８月６日まで	８月７日～９月１９日	９月２０日以降（予定）
従来ワクチン(１価)	オミクロン株対応２価ワクチン ※従来ワクチン(１価)でも可能	オミクロン株XBB.1.5対応１価ワクチン ※従来ワクチン(１価)は使用不可

※１回目接種と２回目接種は原則同じワクチンを使用してください。ただし、9/20以降の２回目接種は、XBB.1.5対応1価ワクチンによる接種が基本となる予定です。1回目接種から２７日以上の接種間隔を空けて、２回目を接種してください。
（詳細は決まり次第お知らせします）

３　小児接種

追加接種（３回目以降）

○令和５年９月１９日までの追加接種

（接種対象）　初回接種を完了した５歳以上（５歳の誕生日前日以降）～11歳以下（12歳誕生日前々日以前）
（接種期間）　令和５年９月１９日まで
（接種回数・接種間隔）　原則１回　・　前回接種後３か月以上

○令和５年９月２０日以降の追加接種　【令和５年秋開始接種】

（接種対象）　初回接種を完了した5歳以上（5歳の誕生日前日以降）～11歳以下（12歳誕生日前々日以前）

※乳幼児のファイザー社ワクチンで初回接種（１～３回目）を完了した５歳以上の方も接種できます。
※従来型１価ワクチンでの追加接種（３回目）を行った方も対象です。
※９月19日までにオミクロン株対応２価ワクチンを追加接種した方も、接種できます。

（接種期間）　令和５年９月下旬（予定）から令和６年３月３１日まで

（接種回数・接種間隔）１回　・　前回接種後３か月以上

（使用ワクチン）

９月１９日まで	９月２０日以降（予定）
オミクロン株対応２価ワクチン	オミクロン株XBB.1.5対応１価ワクチン

４　小児接種

⑵　接種券

初回接種（１・２回目）

新たに５歳になる小児へ、随時接種券を発送します。（発行申請等は不要）

※以下の方へは、接種券は発送されません。
（①②の方で乳幼児用接種券を紛失した方は再発行申請が必要です。申請はワクチン専用ダイヤルまで）

①乳幼児用のファイザー社ワクチンで初回接種を１回又は２回接種済の方。
（お持ちの接種券で、乳幼児用ワクチンで３回目接種まで完了してください）

②乳幼児用接種券を申請済で１回も接種しないまま、誕生日を迎え新たに５歳になった方
（お持ちの乳幼児用の１・２回目接種券で、小児用ワクチン接種を受けられます（３回目用接種券は使用しません）

追加接種（３回目以降）

前回接種から３か月経過した１１歳以下の小児へ、随時接種券を送付します。
（発行申請等は不要）

５　乳幼児接種

(1)　接種対象と使用ワクチン

初回接種（１・２・３回目）

（接種対象）　未接種、かつ１回目の接種日翌日に６か月以上４歳以下

※年齢到達は、誕生日前日でカウントします（例：令和4年5月15日生まれの方は、令和4年11月14日から乳幼児ワクチンを接種できます。）
※初回接種については、１回目の接種時の年齢に基づいて判断します。１回目の接種時に４歳だったお子様が、２回目又は３回目の接種時までに５歳の誕生日を迎えた場合、２回目又は３回目接種にも１回目と同じ乳幼児用ワクチンを使用します。

（接種期間）　令和６年３月３１日まで

（接種回数・接種間隔）　３回

【２回目接種】１回目の接種から、通常、３週間

【３回目接種】２回目の接種から、８週間以上

（使用ワクチン）

９月１９日まで	９月２０日以降（予定）
従来ワクチン(１価)	オミクロン株XBB.1.5対応１価ワクチン

※１回目～３回目接種は原則同じワクチンを使用します。ただし、9/20以降の２、３回目接種は、XBB.1.5対応1価ワクチンによる接種が基本となります。２回目接種は1回目接種から２７日以上の接種間隔を空けて、３回目接種は２回目接種から８週間以上の間隔を空けて接種してください。（詳細は決まり次第お知らせします）

６　乳幼児接種

追加接種（４回目）

令和５年秋開始接種

（接種対象）　初回接種を完了した４歳（５歳誕生日の前々日以前）まで

（接種期間）　令和５年９月下旬（予定）から令和６年３月３１日まで

（接種回数・接種間隔）　１回　・　前回接種後３か月以上

（使用ワクチン）

９月２０日以降（予定）
オミクロン株XBB.1.5対応１価ワクチン

⑵　接種券

初回接種、追加接種ともに接種券の発行申請が必要。
（申請はワクチン専用ダイヤルまで）

7　予約方法とワクチン配送　※小児・乳幼児共通

(1)　予約方法

医療機関への直接予約（自院での予約）

保護者⇒医療機関へ直接予約



※ １２歳以上の接種で使用している市予約サイトや予約専用ダイヤルは使用しません。

(2)　ワクチン配送

予約状況に応じて、必要なワクチンを都度配送します。配送日前日の正午までにコロナワクチン担当まで「配送依頼書」をFAXしてください。

医療機関⇒保健所へ「配送依頼書」ＦＡＸ　　保健所⇒医療機関へワクチン配送

※ワクチン配送日は
医療機関によって
異なります

8　他の予防接種との間隔　※小児・乳幼児共通

- インフルエンザワクチンを接種する場合は、接種間隔に関する規定はありません。コロナワクチンと同時に接種することも可能です。



- インフルエンザワクチン以外の予防接種を受ける場合は、原則として、コロナワクチンの接種と**13日以上の間隔**を置く必要があります。



9　問い合わせ先　※小児・乳幼児共通

【コロナワクチン専用ダイヤル】

市ワクチン専用ダイヤル　お問い合わせ専用

TEL **0120-712-160**　毎日／午前９時～午後５時

聴覚に障害があるなど電話での連絡が難しい人は

FAX **0120-655-695**

- 小児用接種券の再発行申請、乳幼児用接種券の申請など
  （接種の予約、予約キャンセルはできません）

兵庫県　新型コロナワクチン小児接種専門相談ダイヤル

（兵庫県が運営しています）

（乳幼児へのコロナワクチン接種についても相談できます）

TEL **0570-004-588**　毎日／午前９時～午後９時　FAX **078-361-1814**

※本相談ダイヤルでは、小児ワクチンの有効性や副反応等の情報提供、その他小児ワクチンに関する相談を受け付けています。診療等の医療行為を行うことはできません。また、接種の可否の判断や個別の医療機関の紹介、接種会場の案内、小児ワクチン以外の相談は対応していません。

10　各ワクチンの取り扱い

※　ファイザー社ホームページから抜粋

(1)　現在使用中のワクチン

※　5～11歳用の１価ワクチンは9月19日まで使用できます。

		6ヵ月～4歳用	5～11歳用	
		コミナティ筋注 6ヵ月～4歳用 （1価:起源株）	コミナティ筋注 5～11歳用 （1価:起源株）	コミナティ筋注 5～11歳用 2価:起源株／オミクロン株BA.4-5
外観	バイアルのイメージ （バイアルキャップ・ラベルの色）	（栗色）	（オレンジ） バイアルラベルの表記が異なります	（オレンジ）
保存期間	超低温冷凍庫（−90～−60℃）	有効期間（24ヵ月）	有効期間（24ヵ月）	
	冷凍庫（−25～−15℃）	保存不可	保存不可	
	冷蔵庫（2～8℃）	10週間	10週間	
	冷蔵庫（2～8℃）で解凍、希釈・穿刺前の状態で冷蔵保存	10週間	10週間	
	室温（8～30℃）で解凍、希釈・穿刺前の状態で室温保存	解凍開始から24時間以内に使用	解凍開始から24時間以内に使用	
	希釈・穿刺後の使用期限※4,※5	希釈後12時間以内	希釈後12時間以内	
解凍時間（目安）	冷蔵庫（2～8℃）	2時間	4時間	
	室温（8～30℃）	30分	30分	
希釈・充填	希釈時の生理食塩液の量	2.2mL	1.3mL	
	1回あたりの接種量（有効成分の含量）	0.2mL（3μg）	0.2mL（10μg）	
	1バイアルあたりの接種回数	10回	10回	
接種回数	初回免疫	1・2・3回目	1・2回目	
	追加免疫	追加免疫の接種では使用しません※6	追加免疫での接種は2023年3月31日をもって終了しました※6	3回目以降

11　各ワクチンの取り扱い

※　厚生労働省作成　令和5年8月10日自治体説明会資料から抜粋

⑵　9月下旬以降使用予定のワクチン

特性＼キャップカラー	ファイザー社 （XBB.1.5株の１価ワクチン） ５歳～11歳用の製剤	ファイザー社 （XBB.1.5株の１価ワクチン） 6か月～4歳用の製剤
希釈	生理食塩液1.3mLで希釈	生理食塩液2.2mLで希釈
接種時期	初回接種　及び　追加接種	初回接種　及び　追加接種
対象・接種量	５歳～11歳　：0.2mL	6か月～4歳　：0.2mL
抗原量	XBB.1.5株　10μg	XBB.1.5株　3μg
1 vialの単位	10回分（特殊な針・シリンジ）	10回分（特殊な針・シリンジ）
最小流通単位 （一度に接種会場に配送される最小の数量）	10バイアル（100回接種分）	10バイアル（100回接種分）
保管温度	－75℃±15℃：18か月 －20℃±　5℃：不可 　２～８℃　　：10週（※２）	－75℃±15℃：18か月 －20℃±　5℃：不可 　２～８℃　　：10週（※２）
備考	・室温では24時間以内に使用する （一度針を刺した後は12時間以内に使用、解凍後の再凍結は不可）	・室温では24時間以内に使用する （一度針を刺した後は12時間以内に使用、解凍後の再凍結は不可）